



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

# **Uso de la Metodología *Wavelets* Para la Validación de la Regla de La Raíz del Tiempo y su Aplicación al Riesgo de Mercado**

**Javier Eliecer Pirateque Niño**

Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Economía  
Bogotá, Colombia  
2013

# **Uso de la Metodología *Wavelets* Para la Validación de la Regla de La Raíz del Tiempo y su Aplicación al Riesgo de Mercado**

**Javier Eliecer Pirateque Niño**

Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título de:

**Magister en Ciencias Económicas**

Director (a):

Hector William Cárdenas Mahecha

Línea de Investigación:  
Economía Financiera

Universidad Nacional de Colombia  
Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Economía  
Bogotá, Colombia  
2013

*A mi familia, a mis amigos y a todas las  
personas que siempre han estado conmigo.*

## Resumen

Bajo el supuesto de que una serie de retornos es independiente e idénticamente distribuida, la dimensión temporal del riesgo es irrelevante. De esta forma, la volatilidad calculada sobre un intervalo de tiempo (e.g. mensual) puede ser estimada a partir de la calculada sobre otro intervalo (e.g. diario), mediante la regla de la raíz del tiempo. El presente documento presenta una metodología avanzada, que al igual que las más tradicionales, evidencia que la utilización de dicha raíz es errónea debido a que existe dependencia de largo plazo en algunas de las series financieras colombianas. Asimismo, se exponen algunas de las consecuencias más importantes de dicha dependencia (en especial sobre el cálculo del riesgo de mercado) y se proponen algunos parámetros de escalamiento.

**Palabras clave:** *Wavelets*, dependencia de largo plazo, raíz cuadrada del tiempo, análisis multi-resolución y riesgo de mercado.

## Abstract

Under the assumption that return series are independent and identically distributed, the time dimension is irrelevant. Therefore, the volatility calculated over one interval of time (e.g. monthly) can be estimated using another interval (e.g. daily), by employing the square rule of time. This document presents an advanced methodology to show that the use of the square root of time is invalid due to the long term dependence of some of the most important financial time series in Colombia. Likewise, the document presents some of the most important consequences (especially those related to market risk) and proposes some parameters to scale.

**Key words:** *Wavelets*, long term dependence, square root of time, multiresolution analysis and market risk.

## 1. Introducción

La teoría tradicional sugiere que una serie de tiempo afectada por un gran número de eventos (o en términos estadísticos con muchos grados de libertad) tiende a volverse totalmente aleatoria. Un caso particular de series con tales características son las financieras, que al ser generadas por la interacción de muchos agentes, tienden a tener un comportamiento de tan difícil predicción bajo las herramientas tradicionales, que se definen como una caminata aleatoria. Dicha concepción se racionaliza mediante la teoría de los mercados eficientes, que sugiere que dicho comportamiento es el resultado natural de las fuerzas del mercado.

Una consecuencia clave del mencionado análisis es la llamada regla de la raíz del tiempo, que dice que si una serie se comporta como una caminata aleatoria su volatilidad diaria puede ser reescalada a la de  $n$  días simplemente multiplicando por  $\sqrt{n}$ . Dicha consecuencia generó tantas aplicaciones prácticas que algunos trabajos buscaron responder si en realidad esta tenía sentido.

Tales trabajos han formulado diversas metodologías que, además de pretender demostrar que tal concepción no es válida, buscan identificar cual sería el verdadero parámetro de escalamiento. A pesar de que globalmente no existe una metodología superior para la validación de la regla de la raíz del tiempo y para la estimación de los parámetros de dependencia de largo plazo, el presente trabajo busca implementar una metodología que, además del análisis tradicional de las series en el dominio tiempo, toma en cuenta también el dominio de la escala<sup>1</sup> o frecuencia.

Dicha metodología se eligió principalmente debido a las propiedades de los estimadores (que son consistentes y de baja varianza, pese a estar sesgados como se mostrará más adelante), y en razón de la capacidad de adaptación local de los *wavelets*, que facilita el análisis de los saltos y los *clusters* de volatilidad presentes en las series financieras. Cabe anotar que esta elección también se debió a trabajos como el de Racine (2011), Boutahary Khalfaoui (2011) y Bardet *et al.* (2000), que demuestran que esta metodología tiene una mayor convergencia en comparación con otras. El análisis se complementa con una de las aplicaciones prácticas más importantes, que es el re-escalamiento del VaR (valor en riesgo, por sus siglas en inglés), y con el análisis de su validez para distintas series financieras colombianas.

El presente documento se compone de siete secciones, incluida la presente introducción. La segunda sección presenta una descripción de la regla de la raíz

---

<sup>1</sup> En la teoría *wavelets* el dominio de la frecuencia se conoce también como escala y difiere del concepto usado en otras metodologías.

del tiempo y su relación con el modelo de caminata aleatoria. La tercera analiza las consecuencias prácticas de la dependencia de largo plazo en algunos de los principales modelos económicos y financieros. La cuarta se ocupa de dar una introducción a la metodología *wavelets* y el análisis tiempo-frecuencia. La quinta contiene un análisis de la relación entre los procesos de memoria larga, los fractales y el análisis multi-resolución. La sexta sección desarrolla y presenta los resultados del cálculo del exponente de Hurst ( $H$ ). Por último, la séptima sección investiga el desempeño y la aplicabilidad del  $H$  encontrado para reescalar el riesgo de mercado en comparación con la regla de la raíz del tiempo.

## 2. La regla de la raíz cuadrada del tiempo y el modelo de caminata aleatoria

La regla de la raíz del tiempo se usa para escalar la volatilidad de las series financieras, especialmente de aquellas en las que no es posible obtener series extensas para lograr estimaciones confiables. Esta regla nace del supuesto de movimiento browniano como dinámica que explica los cambios en los precios de los activos, y simplemente consiste en multiplicar la volatilidad estimada para una serie de periodicidad  $d$  por  $\sqrt{n}$  para hallar la volatilidad con una periodicidad  $n$  (León y Vivas, 2010).

A pesar de que muchas aplicaciones de dicha regla van más allá de la sola estimación de volatilidades e incluyen modelos ampliamente difundidos, como el modelo Black & Scholes para la valoración de opciones financieras y el VaR, aún persisten las dudas sobre si el supuesto que la sostiene es coherente con la realidad.

Tal supuesto nace de la hipótesis de los mercados eficientes, en la que se menciona que los cambios en los precios de los activos financieros son independientes debido a que toda la información disponible es descontada, y ni compradores ni vendedores tienen ventajas<sup>2</sup>. Esta hipótesis da como resultado que si el precio de un activo financiero se comporta como una caminata aleatoria (sin importar si está normalmente distribuida o no), dicho supuesto se cumple<sup>3</sup>.

Si el precio de un activo financiero sigue una caminata aleatoria<sup>4</sup> de la forma:  $y_t = y_{t-1} + \mu_t$ , donde  $\mu_t \sim N(0, \sigma^2)$  y  $y_0 = 0$ . Por sustitución recursiva se tiene que:  $y_t = y_{t-1} + \mu_t = y_{t-2} + \mu_{t-1} + \mu_t = \dots = y_0 + \mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_t$ . Substituyendo

<sup>2</sup> Aunque esta es la definición tradicional, al momento de hacer estimaciones empíricas ésta se caracteriza como fuerte, semi-fuerte o débil.

<sup>3</sup> Lo contrario no necesariamente es cierto, pues la eficiencia de mercado solo requiere de independencia.

<sup>4</sup> Si se supone que los cambios en los precios son independientes, se esperaría que éstos fueran normales con media estable y varianza finita por el teorema central de límite.

$y_0 = 0$  y aplicando la propiedad de la varianza para procesos independientes se obtiene:  $Var(y_t) = Var(\mu_1) + Var(\mu_2) + \dots + Var(\mu_t) = t\sigma^2$ . Si se caracteriza el proceso por la desviación estándar se obtiene:  $\sigma_t = \sqrt{t}\sigma$ . Este es el origen de la raíz cuadrada del tiempo.

Como se muestra claramente en el razonamiento anterior, la idea de la regla de la raíz del tiempo reside totalmente en la idea de que los precios se comportan como una caminata aleatoria y que los retornos son independientes; es decir, en la hipótesis de los mercados eficientes. Dicha teoría no solo ha sido muchas veces descartada para el caso colombiano (ver Uribe y Ulloa, 2011 ó Pérez y Mendoza, 2010), sino que ha sido establecida como el paradigma más frágil de la teoría de las finanzas modernas. En este último aspecto, por ejemplo, Ball (1995) menciona que las limitaciones de dicha teoría son muchas y que incluso pueden ser clasificadas en tres categorías: i) las que se relacionan con la falla en la explicación del comportamiento de los precios, ii) los defectos en la eficiencia como modelo de mercados y iii) los problemas en las pruebas de eficiencia para explicar los modelos de mercado.

Los problemas de la teoría en la explicación de los comportamientos del mercado se suman a los de los métodos econométricos tradicionales para hacer menos válida su aplicación en la práctica. Dichos problemas tienen que ver, según Peters (1991), con los conceptos de equilibrio que subyacen a dichos métodos, y la fijación del horizonte de inversión como irrelevante o como una variable cualquiera. El primero tiene que ver con la idea de que los choques en los modelos tradicionales son temporales y decaen exponencialmente en el tiempo, lo que es contradictorio con la característica evolutiva de éste tipo de sistemas, y el segundo que tiene que ver con la idea de una memoria limitada del pasado para unos casos o la no importancia de la tendencia en otros.

Esto último es de gran importancia, ya que la retroalimentación real de un inversionista considera correlaciones de largo plazo y eventos pasados para la toma de decisiones. De igual forma, es importante anotar que el primer problema aparece no solo en la econometría tradicional, sino que viene desde la definición de la teoría de los mercados eficientes, pues se supone que el arbitraje siempre corregirá las desviaciones que haya en los valores justos (los que descuentan toda la información disponible), lo cual genera un equilibrio estocástico permanente.

Aunque una forma de comprobar fácilmente si una serie de precios es una caminata aleatoria es hacer una prueba de raíz unitaria para comprobar el parámetro que acompaña  $ay_{t-1}$ , y una prueba de normalidad de los precios, tales pruebas no servirían para establecer cuál debería ser el verdadero parámetro de escalamiento. De igual forma, dicha prueba solo se ocuparía de problemas de

autocorrelación de corto plazo, y no de la dependencia de largo plazo, que es la que concierne a este trabajo. Es por esta razón que han surgido otros métodos que, además de demostrar que los retornos no son independientes, calculan el grado de dependencia de éstos.

En Colombia, los trabajos sobre este tema se han enfocado hacia la estimación del exponente de Hurst ajustado y el estadístico  $V_q$  de Lo (1991) para distintas series financieras. Los trabajos de León y Vivas (2010) y Leiton (2011) realizan las estimaciones del primer coeficiente mediante la metodología de rango reescalado clásico (R/S) y modificado (mR/S)<sup>5</sup>, mientras el primer trabajo lo complementa hallando el estadístico  $V_q$  mencionado.

El exponente de Hurst se define en términos del comportamiento asintótico del rango reescalado de una serie de tiempo. Dicho rango reescalado clásico se define como el rango (R) de la desviación acumulada de una serie de tiempo  $y_t$  frente a su media  $\bar{y}$  durante un período  $n$ ; ajustado por la desviación estándar (S) de  $y_t$ . Empíricamente Hurst (1951) encontró que dicho rango podía ser representado por medio de la siguiente ecuación:

$$\frac{R(n)}{S(n)} = Cn^H \quad (1)$$

Donde,  $H = 0,5$  representa incrementos independientes (gaussianos o no gaussianos) como los de una caminata aleatoria,  $0,5 < H < 1$  procesos en los que la memoria de largo plazo muestra persistencia<sup>6</sup> y  $0 < H < 0,5$  procesos en los que la memoria de largo plazo muestra antipersistencia<sup>7</sup>.

A partir de una linealización por medio de logaritmos y una estimación por MCO (mínimos cuadrados ordinarios) los trabajos mencionados estiman  $H$  como el índice de dependencia de largo plazo, y  $H_{adj}$ <sup>8</sup> para corregir por el sesgo que se origina en la estimación con series finitas de propiedades asintóticas. A través de la metodología mR/S se estimó de una manera similar dicho parámetro, al cambiar el parámetro usual de estandarización (que era la desviación estándar) por un estimador que incluía la varianza y la autocovarianza de los datos hasta un rezago  $q$  a fin de hacer robusta la estimación ante dependencias de corto plazo.

<sup>5</sup> La ventaja de la segunda metodología se encuentra en la capacidad de excluir la incidencia de procesos de memoria de corto plazo en la estimación de la dependencia de largo plazo.

<sup>6</sup> Persistencia significa que un retorno de signo positivo tiene una alta probabilidad de ser seguido por otro del mismo signo, y viceversa.

<sup>7</sup> Antipersistencia significa que un retorno de signo positivo tiene una alta probabilidad de ser seguido por uno negativo, y viceversa.

<sup>8</sup>  $H_{adj} = H - (H_f - 0,5)$ .



Ambos trabajos encontraron que las series de tiempo financieras colombianas tienen un  $H_{adj} > 0,5$ , por lo que concluyen que existe memoria de largo plazo y que el parámetro de escalamiento de dichas series debe ser el encontrado. De igual forma, este resultado fue reforzado con el estadístico  $V_q$  para el caso del IGBC e IDXTES (índices del mercado de renta variable y fija, respectivamente), más no para la TRM. Este último estadístico se estimó en razón de la dificultad para realizar pruebas estadísticas sobre el exponente  $H$  estimado mediante mR/S.

Pese a que la metodología mR/S supone que el proceso de la variable aleatoria es de tipo gaussiano y que se basa en un estadístico sesgado (Taquet *al.*, 1999), y pese a que ésta no captura el proceso de memoria de largo plazo de ciertos procesos (Peters, 1991), los trabajos descritos concluyen que el mercado accionario y de renta fija colombianos presentan memoria de largo plazo. Esto no se extiende al mercado cambiario debido a que el estadístico  $V_q$  no es concluyente para ningún rezago  $q$ . En este sentido, el trabajo de Leiton (2011) recomienda explorar otras metodologías para cuantificar la dependencia de largo plazo y fortalecer los resultados encontrados en los primeros trabajos.

### **3. Consecuencias prácticas de la dependencia de largo plazo**

En general, existen pocos trabajos que tratan el tema de la dependencia de largo plazo de las series financieras<sup>9</sup>. De hecho las mediciones que se han hecho sobre éstas se han dado solo para ver si se comportan o no como caminatas aleatorias usando la metodología tradicional que las caracterizan como: débil, semifuerte y fuerte. Dichas caracterizaciones utilizan pruebas que se basan únicamente en dependencias de corto plazo (e.g. modelos GARCH) y usan el supuesto de que por el teorema del límite central los cambios en los precios son normales con media estable y varianza finita, lo que es inválido si existiese dependencia de largo plazo.

Las implicaciones de no tomar en cuenta la dependencia de largo plazo se refleja en el amplio uso de la regla de la raíz del tiempo. Entre los temas que más utilizan este supuesto están aquellos relacionados con análisis de volatilidades, medición de riesgos y optimización de portafolios. En cuanto al análisis de volatilidades, esto se refleja en la idea de que el cambio en la variabilidad de una serie es explicado por los choques más recientes (e.g. modelos GARCH y EWMA), y la irrelevancia de los ciclos de longitud no periódica en la explicación de la misma.

---

<sup>9</sup>La literatura internacional se ha enfocado en la realización de pruebas para determinar la presencia de memoria de largo plazo en series financieras que van desde tasas de interés hasta otras que miden la volatilidad del mercado accionario. Una recopilación de los más importantes trabajos que se han hecho sobre el tema puede ser encontrada en Baillie (1996).

En la medición de riesgos este supuesto se refleja en la utilización de dicha práctica para re-escalar el VaR de corto plazo a fin de obtener el de largo plazo. Dicha práctica resulta poco confiable pues existen muchos problemas al intentar extrapolar las volatilidades. De hecho, en la revisión realizada durante 2009 por el Comité de Basilea a los estándares cuantitativos del cálculo del riesgo de mercado se encontró que la regla de la raíz del tiempo subestima significativamente el riesgo, por lo que en la actualidad el uso de dicha regla debe realizarse bajo un sustento técnico adecuado que satisfaga los requerimientos del ente supervisor (BIS, 2009).

Para el caso de la optimización de portafolios esto se refleja en la irrelevancia del horizonte de inversión y la idea de que los precios recogen toda la información disponible. Si se supone que los retornos de los activos no siguen una caminata aleatoria gaussiana, anualizar la volatilidad mediante la regla de la raíz cuadrada del tiempo no genera un estimativo real del nivel de riesgo asociado con la inversión, por lo que inversionistas que desean valorar posiciones basados en un nivel objetivo de volatilidad no logran buenos estimativos. Holton (1992) demuestra que una de las implicaciones es que el riesgo de la inversión es una función no solo del tipo de activo considerado, sino también del horizonte de inversión preferido por el inversor. Peters (1991) igualmente demuestra que incluso pequeñas desviaciones de un comportamiento puramente aleatorio puede llevar a que los inversionistas malinterpreten su nivel de riesgo real.

Si el período de inversión es irrelevante, la consecuencia es que para un nivel dado de volatilidad todos los inversionistas son recompensados con una prima de riesgo idéntica sin importar si están invirtiendo a corto o a largo plazo. Esto es contra intuitivo, pues a mayor plazo se espera que aumente el valor de la prima de riesgo de mercado. Igualmente, como demuestra Gregoriou (2009), portafolios de media-varianza que se hallan con la regla de la raíz exhiben niveles exagerados de media y volatilidad.

Otras aplicaciones comunes de las reglas de escalamiento de la volatilidad en economía financiera están relacionadas con la estimación de la volatilidad de largo plazo en modelos como el CAPM (*Capital Asset Pricing Model*) y el modelo de valoración de opciones de Black-Scholes, los cuales son típicamente estimados con base en medidas anualizadas del retorno de los activos y de la volatilidad de éstos. Gregoriou (2009) demuestra que en el caso del CAPM, si los retornos poseen una dependencia negativa de largo plazo ( $H < 0,5$ ), las inversiones mantenidas en el largo plazo son relativamente menos riesgosas y las inversiones mantenidas en el corto plazo son relativamente más riesgosas que lo predicho por la raíz cuadrada del tiempo. Alternativamente, si los activos tienen dependencia positiva de largo plazo ( $H > 0,5$ ), las inversiones mantenidas en el corto plazo son

relativamente menos riesgosas e inversiones mantenidas en el largo plazo son relativamente más riesgosas que lo predicho por la regla de la raíz del tiempo. Batten y Ellis (2005), de igual forma, demuestran que el inapropiado escalamiento del riesgo subestima el precio de las opciones *put* y *call* en los mercados de divisas.

En Colombia, León *et al.* (2012) estiman el sesgo del CAPM en cuanto a los betas y los retornos esperados, y demuestran que el supuesto de neutralidad del horizonte del tiempo es inválido. Este trabajo resalta la importancia del horizonte de inversión para el manejo del riesgo y la asignación del capital, y realiza pruebas estadísticas con un 99% de confianza que demuestran que más del 60% de las acciones exhiben betas que son estadísticamente diferentes de aquellos que incorporan el efecto de la dependencia de largo plazo. Por esta razón se enfatizan los resultados de Holton (1992) sobre la doble dimensión del riesgo, que abarca tanto la clase de activo, como el período de tenencia, y se propone una metodología para crear un modelo CAPM dependiente del horizonte de inversión.

Puesto que el uso del modelo CAPM y Black Scholes es amplio y abarca temas que van desde la selección de portafolio hasta la fijación de precios de servicios públicos<sup>10</sup>, su correcta especificación debe ser revalidada pues, como se demuestra más adelante, algunas de las series colombianas tienen un alto grado de dependencia. Dicha revalidación debe buscar que los modelos expliquen situaciones tradicionales del mercado, como los comportamientos de manada o la heterogeneidad en el horizonte de tiempo de los agentes, pues en realidad éstas son algunas de las causales de dicha dependencia<sup>11</sup>.

#### **4. Introducción a la metodología *wavelets* y el análisis tiempo-frecuencia**

En general, las técnicas estadísticas usadas en economía están diseñadas para modelar las series de tiempo en el dominio del tiempo. Esto es proveer una descripción adecuada de cada componente de la serie (de forma conjunta o separada), según corresponda a la parte irregular, cíclica, tendencial o estacional.

Para hacer esto generalmente se usan modelos estructurales (e.g. filtro de Kalman) u otros enfoques clásicos que se enmarcan dentro de la regresión (e.g. ARIMA). El primer tipo de modelo se enfoca en la representación de alguna componente de la serie, siendo su principal característica el dinamismo que

---

<sup>10</sup> En Colombia la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) y la CRC (Comisión de Regulación en Telecomunicaciones) usan el CAPM para el cálculo de los cargos de acceso a algunos servicios públicos.

<sup>11</sup> Cont (2002) considera que los mecanismos económicos que explican la dependencia de largo plazo son los siguientes: la heterogeneidad en los horizontes de tiempo de los agentes, el comportamiento evolutivo de los mismos, los cambios en las estrategias de *trading* y la inercia de los inversores.

permite que los coeficientes evolucionen a través del tiempo, mientras que el segundo es más general, pues mediante la diferenciación de la serie intenta eliminar la parte tendencial y estacional a fin de modelar todo en conjunto.

A pesar de que estas técnicas son las más usadas, no son las únicas, pues existen otras que estudian el comportamiento de la serie pero en el dominio de la frecuencia. Dichas técnicas, como el análisis de Fourier, simplemente descomponen la serie de tiempo en términos de funciones seno y coseno de diferentes frecuencias en vez de las componentes tradicionales. Al igual que ocurre con las componentes del dominio del tiempo, la serie inicial se puede obtener como la suma de cada una de las funciones seno y coseno.

Las técnicas del dominio de la frecuencia son usadas generalmente para encontrar la contribución de cada frecuencia a la varianza total de la serie y para el análisis de las componentes cíclicas y estacionales. En el primer caso son bastante útiles debido a que señalan que frecuencias de la serie, y por tal que períodos<sup>12</sup>, son los que más explican la variabilidad de la misma. En el segundo caso, son útiles para crear filtros, como el de Hodrick y Prescott, que remueven componentes de frecuencia que están en un rango en particular y que se consideran no pertenecen a las componentes que se quieren aislar.


Existe una metodología que realiza el análisis simultáneamente en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, y se conoce como transformación *wavelet*. Esta técnica tiene la particularidad de hacer un análisis local (es decir se enfoca en tramos de la serie) frente al global que hacen las técnicas del dominio de la frecuencia (se enfocan en obtener características conjuntas de toda la serie), y también la particularidad de que no usa estrictamente frecuencias para presentar sus resultados, sino escalas o niveles de resolución.

Dicha transformación, como su nombre lo indica, se basa en un tipo especial de funciones conocidas como funciones *wavelet* ( $\psi(t)$ ), caracterizadas por dos propiedades conocidas como la condición de la integral igual a cero ( $\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t)dt = 0$ ) y energía unitaria ( $\int_{-\infty}^{\infty} \psi^2(t)dt = 1$ ). Al contrario de las funciones seno y coseno, las funciones *wavelet* no oscilan alrededor de cero sino que se desvanecen alrededor de éste (por eso su nombre). El Gráfico 1 presenta algunos ejemplos de funciones *wavelet*.

---

<sup>12</sup> La frecuencia es una magnitud que es inversa al período.

### Gráfico 1. Ejemplos de funciones *wavelet*



Fuente: Crowley (2005)

La transformación *wavelet* se descompone en dos grandes tipos de transformaciones: la transformación *wavelet* continua (CWT) y la transformación *wavelet* discreta (DWT). La primera usa una sola función *wavelet* que se conoce en la literatura como función *wavelet* madre, mientras que la DWT usa dos funciones: la función *wavelet* madre y la función *wavelet* padre ( $\phi(t)$ ), que se diferencia de la madre en que su integral sobre  $t$  es igual a uno.

Desde un enfoque matemático, la CWT se define como la proyección de la función *wavelet* madre en la serie de tiempo analizada, mediante el producto interior de los elementos de las mismas (ver ecuación 2). Esta proyección se basa en la dilatación ( $W(x) \rightarrow W(2x)$ ) y translación de una función ( $W(2x) \rightarrow W(2x - 1)$ ), que genera como resultado lo que en la literatura se conoce como coeficientes *wavelets* o detalles.

$$W_{(\lambda,t)}^H = \int_{-\infty}^{\infty} x(u) \Psi_{\lambda,t}^H(u) du \quad (2)$$


Donde

$$\Psi_{\lambda,t}^H(u) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \psi^H\left(\frac{u-t}{\lambda}\right) \quad (3)$$


Los pasos para obtener todos los coeficientes son los siguientes<sup>13</sup>:

1.) Se selecciona una función *wavelet* y se compara con la sección inicial de una serie de tiempo.


2.) Se calcula el coeficiente *wavelet*, que en valor absoluto representa el grado de asociación entre la función *wavelet* y la sección con la que se compara (entre más grande mayor). Ejemplo: Si  $y_t=[4, 3, 2,0,1]$  representa los valores de la serie en ese tramo y  $w=[0,0.2,0,-0.2,0]$  los valores de la función *wavelet* en el mismo, el coeficiente *wavelet* sería igual a  $C= (4 \cdot 0) + (3 \cdot 0,2) + (2 \cdot 0) + (0 \cdot -0,2) + (1 \cdot 0) = 0,6$  , que indicaría que las funciones están en algún grado correlacionadas.



3.) Se mueve la función *wavelet* a la derecha y se repite el paso 1 y 2 hasta que la función *wavelet* cubra toda la serie.



4.) Se escala (expande o contrae) la función *wavelet* y se repiten los pasos 1 a 3.




<sup>13</sup> Tomado de Misiti et al. (2011).

5.) Se repiten los pasos 1 a 4 para todas las escalas.

Desde un enfoque estadístico los coeficientes *wavelet* de la CWT se interpretan como promedios ponderados de una serie que cambian de un período a otro. En términos simples, los coeficientes *wavelet* se pueden interpretar con base en una línea de tiempo que contiene información de una serie de tiempo dividida en dos intervalos adyacentes como la presentada en el Gráfico 2.

**Gráfico 2.**




El coeficiente *wavelet* en el momento  $t$  y la escala  $\lambda$  (suponiendo que se utiliza el *wavelet* Haar), correspondiente a la serie descrita, sería igual a la diferencia entre el promedio 2 menos el promedio 1. Al cambiar el momento (translación), se obtiene un nuevo coeficiente al igual que al cambiar la escala (dilatación).

Un ejemplo sencillo de cómo funciona la CWT es tomar una serie de tiempo de longitud 1000 compuesta por ceros y un salto igual a 1 en el momento 500. La CWT (nuevamente usando el *wavelet* Haar) es la presentada en la Gráfico3<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Evidentemente la representación tridimensional es necesaria pues los coeficientes están en función del tiempo y la escala.

**Gráfico 3. Valor absoluto de los coeficientes *wavelet***



Fuente: cálculo del autor

Donde los colores cálidos representan cambios grandes y los fríos cambios pequeños según la barra de la derecha. Como se puede observar, alrededor de la observación 500 se encuentran todos los coeficientes diferentes a cero pues es el único punto donde hay un salto que crea diferencia en los promedios adyacentes. De igual forma se observa que a medida que aumenta la escala aumenta el número de coeficientes diferentes de cero, pues la longitud de los promedios aumenta permitiendo que capturen el efecto del salto en la serie.

Si, por ejemplo, la serie de tiempo analizada representa la tasa de cambio mensual, un gráfico de  $C(\lambda = 3, t)$  contra el tiempo dirá qué tan rápido varía la tasa de cambio promedio sobre el trimestre de un trimestre a otro; al incrementar la escala  $\lambda$  hasta un año, el gráfico de  $C(\lambda = 12, t)$  dirá cuánto varía la tasa de cambio promedio anual de un año al siguiente.

Debido a la gran versatilidad de esta herramienta, que permite capturar detalles importantes y darnos una idea general del comportamiento de una serie, Schleicher (2002) la compara con unos lentes de cámara de amplio alcance que permiten tomar fotos de un paisaje extenso, a la vez que permite realizar un zoom sobre los detalles microscópicos que normalmente son imperceptibles para el ojo humano. Igualmente, Graps (1995) define el análisis *wavelets* como mirar el




bosque para detectar grandes particularidades y a la vez los arboles para detectar las pequeñas.

Para cada *wavelet* particular se tiene una interpretación diferente, pero en todos los casos la idea es analizar la diferencia entre promedios. Por ejemplo, “el sombrero mexicano”, da como resultado una diferencia entre un promedio ponderado en una unidad de escala y el promedio de dos promedios ponderados alrededor de ésta.

Debido a que la CWT es redundante, en el sentido de que hace una representación bidimensional (tiempo y escala) de una serie que tiene solo una dimensión (tiempo), y debido a que discontinuidades como las presentadas en el primer ejemplo son observadas en algún grado en cada escala, se creó una versión más simplificada de la CWT, conocida como DWT (transformación *wavelet* discreta por sus siglas en inglés). La submuestra de los elementos de la CWT que se usan en la DWT,  $W(\lambda, t)$ , son aquellos cuyas escalas de dilatación son binarias ( $2^j$ ), y donde  $t$  es tal que es múltiplo de  $2^{j-1}$ .

La forma eficiente de implementar tal esquema fue desarrollado por Mallat (1988) mediante el algoritmo que lleva su nombre, y que consiste de dos filtros: un filtro pasa bajos (*lowpassfilter*) y un filtro pasa altos (*highpass*), en el que el primero filtra los coeficientes obtenidos con base en la función *wavelet* padre y el segundo los coeficientes obtenidos con base en la función madre. En la práctica tales coeficientes son muy importantes pues los primeros representan la tendencia suavizada de la serie (conocidos como aproximaciones) y los segundos las desviaciones de dicha tendencia (conocidos como detalles)<sup>15</sup>. Gráficamente, el algoritmo de Mallat se puede representar como en la Gráfico 4.

**Gráfico 4. Algoritmo de Mallat**




Fuente: Misitiet *al.* (2011)

<sup>15</sup> Para ver más detalles y ejemplos numéricos del algoritmo de Mallat remitirse a Schleicher (2002).

Con las aproximaciones obtenidas a partir de la DWT es posible realizar una nueva DWT a fin de obtener nuevos niveles de resolución para cada componente. Esto se conoce en la literatura como análisis multi-resolución (MRA) (ver Gráfico5).

**Gráfico 5. Análisis Multi-resolución<sup>16</sup>**



Fuente: Misitiet *al.* (2011)

Según Lahura y Vega (2011) el MRA es la formalización matemática de una idea simple: obtener sucesivas aproximaciones de una serie, de tal forma que cada nueva aproximación es mejor que la última. Si  $\{\dots, S_j, S_{j-1}, S_{j-2}, \dots\}$  representa un MRA, entonces  $S_{j-1}$  es una mejor aproximación que  $S_j$ , esto es con una mejor resolución. Las diferencias entre las varias aproximaciones son los detalles y pueden ser denotados como  $D_j = S_{j-1} - S_j$ , por lo que una aproximación puede ser expresada como la suma de una resolución más baja más un detalle,  $S_{j-1} = D_j + S_j$ . En general, si  $S_1$  denota la mejor aproximación (una con la mejor resolución) de una serie  $f(t)$ , entonces  $f(t) = S_1 + D_1$ . Si un MRA existe para una serie, entonces es posible obtener diferentes aproximaciones de la serie expresada como la suma de una aproximación de menor resolución y un detalle. En particular, la secuencia  $S_1 = D_2 + S_2, S_2 = D_3 + S_3, \dots, S_{j-2} = D_{j-1} + S_{j-1}, S_{j-1} = D_j + S_j$ . De esta forma, el análisis multi-resolución es capaz de expresar una serie  $f(t)$  como la suma de una aproximación  $S_j$  y diferentes detalles  $D_j$ :

$$f(t) = S_j + D_j + D_{j-1} + \dots + D_j + \dots + D_1 \quad (4)$$

La interpretación de los detalles es qué tanta información es ganada (perdida) si la serie  $f(t)$  fuese muestreada más (menos) frecuentemente. Por ejemplo, si cada dos observaciones de los valores de  $f(t)$  son promediados de tal forma que  $S\left(\frac{t}{2}\right) =$

<sup>16</sup>cA: Coeficientes de Aproximación. cD: Coeficientes de Detalles.

$\frac{(f(t)+f(t+1))}{2}$  para diferentes  $t$ , los detalles serían las cantidades faltantes para obtener la serie original  $f(t) = S(t) + D_j$ .

La aproximación, de igual forma, puede ser vista como la serie suavizada o como la parte cíclica y de tendencia de una serie, mientras que los detalles como la parte irregular de la misma. Según esta interpretación, cada detalle corresponde a variaciones de la serie que ocurren con determinada frecuencia (la de la escala  $j$ ), siendo el primer detalle el correspondiente a la mayor frecuencia y el último al de la menor. La descomposición de la serie en aproximación y detalles tiene la propiedad de que la suma de la varianza de cada uno de estos componentes es la varianza total de la serie.

### **5. Procesos de memoria larga, fractales y su relación con el análisis multi-resolución.**

Para realizar un análisis de la dependencia de largo plazo de una serie temporal se debería conocer el proceso generador de datos de la misma, o en su defecto una serie de observaciones lo suficientemente larga de forma que esta pudiese ser caracterizada de manera fiable. Como esto no es posible en la mayoría de aplicaciones, se debe asumir que ésta se comporta como un fractal, de forma que los comportamientos de corto plazo se extienden a los de largo plazo. Dichos fractales son procesos de memoria larga que tienen algunas propiedades particulares al ser analizados mediante un análisis multi-resolución, como se muestra en esta sección.

Los procesos de memoria larga son series que por naturaleza tienen observaciones que dependen de otras separadas por grandes intervalos de tiempo, lo que se traduce en autocorrelaciones que decaen de forma lenta (decaimiento hiperbólico), y pueden ser representadas mediante distintas clases de procesos. En el dominio de la frecuencia, estas series se caracterizan por tender a infinito al acercarse a frecuencias cercanas a cero.

Matemáticamente, y en el dominio del tiempo, la condición antes mencionada para las autocovarianzas se pueden expresar así:

$$\gamma(\tau) \approx |\tau|^{2d-1}, \text{ cuando } |\tau| \rightarrow \infty$$

Donde  $\tau$  es el rezago del tiempo de un proceso estacionario  $x(t)$ , y  $d$  el parámetro de memoria de largo plazo. En el dominio de la frecuencia, la presencia de memoria de largo plazo se expresa mediante el comportamiento de la función de densidad espectral  $f(\omega)$ :

$$f(\omega) \approx c|\omega|^{-2d}, \text{ cuando } \omega \rightarrow \infty$$

Donde  $\omega \in (-\pi, \pi)$  y  $c > 0$

Como se desprende de las ecuaciones anteriores, la dependencia de largo plazo depende del comportamiento de largo plazo de la función de autocorrelación para rezagos muy grandes, el cual es difícil de estimar en la práctica. Por esta razón, modelos con dicha dependencia son usualmente formulados en términos de procesos autosemejantes<sup>17</sup> u otro tipo de procesos más generales como los fractales, que permiten deducir comportamientos de largo plazo a partir de comportamientos de corto plazo mediante la extrapolación, pues estos últimos son más fácilmente observables.


Según Peters (1991), los fractales aleatorios (los usados en series de tiempo) se definen con base en los fractales determinísticos de las matemáticas. Dichos objetos se entienden como aquellos en los cuales las partes están en alguna forma relacionadas con el todo y no son explicables mediante la geometría euclidiana tradicional, que vuelve más simple los objetos al acercarse más al detalle (e.g. un bloque tridimensional se vuelve un plano de dos dimensiones, y éste a la vez se vuelve una línea en una sola dimensión hasta que finalmente se vuelve un punto).

Los fractales, por lo contrario, son objetos que muestran más detalle entre más se está cerca (e.g. los arboles se enraman de acuerdo a una estructura fractal, pues cada rama con sus ramas más pequeñas, es similar al árbol completo en un sentido cualitativo). De igual forma, muestran autosemejanza, que en el caso de los objetos se da con respecto al espacio, y que en el caso de las series de tiempo fractales se da con respecto al tiempo (ver Gráfico 6).

---

<sup>17</sup>*Self-similar process* en inglés.

## Gráfico 6. Serie fractal



Fuente: Abry *et al.* (2009)

Una medida de qué tan irregular es una serie es la dimensión fractal. Dicha dimensión tradicionalmente se define en términos de la relación que existe entre la cantidad de círculos necesarios para cubrir una serie de tiempo y su radio. Si se cuenta el número de círculos con determinado diámetro que se necesitan para cubrir la serie completa; y luego se incrementa el diámetro y se cuenta nuevamente el número de círculos, se encuentra que el número de círculos tiene una relación exponencial con el radio del círculo mediante:  $N(2r)^{D_f} = 1$ . Despejando se encuentra que la dimensión fractal es igual a:

$$D_f = \frac{\log N}{\log\left(\frac{1}{2r}\right)} \quad (5)$$

Donde,  $N$  es el número de círculos,  $r$  el radio de los círculos.

Esta medida es importante en el caso de las series que presentan memoria de largo plazo, ya que como demuestra Peters (1991),  $H$  puede ser reescrito en términos de  $D_f$  como:  $H = 2 - D_f$ . En este sentido,  $H$  sirve para cuantificar el grado de heterogeneidad de una serie, pues a medida que  $H$  aumenta la dimensión fractal disminuye hasta llegar a una serie que es totalmente homogénea, es decir que no cambia en el tiempo.

La estimación del exponente  $H$ , y por lo tanto de  $D_f$ , puede realizarse utilizando análisis en varios dominios: el del tiempo, el de la frecuencia o el de tiempo-escala (ver Cuadro 1). En el dominio del tiempo, los análisis se centran en los primeros y

segundos momentos de la serie, corregidos por tendencia en algunos casos (e.g. R/S). En el dominio de la frecuencia, el análisis se enfoca en las características del periodograma<sup>18</sup> o en las características de otros estimadores que mejoran el desempeño de éste<sup>19</sup>. Por último, el análisis *wavelet* basa totalmente su análisis en la transformada *wavelet* (Arango *et al.*, 2001).

**Cuadro 1. Análisis en varios dominios usados para estimar  $H$**

<b>Dominio del tiempo</b>	<b>Dominio de la frecuencia</b>	<b>Dominio tiempo-escala</b>
Análisis de dispersión	Periodograma	Transformada <i>wavelet</i>
Análisis de rango	Promedio ponderado en segmentos	
Análisis de varianza	traslapados (WOSA)	

Fuente: Arango *et al.*, (2001)

El análisis en el dominio tiempo-escala, además de poseer ventajas frente a los otros análisis por sus propiedades de localidad y de captura de características de los estimadores del resto de dominios, tiene la ventaja de estar relacionado con los procesos más importantes de la literatura financiera.

Uno de estos procesos, y que es ejemplo de proceso fractal, es el movimiento browniano fractal (fBm), definido por Mandelbrot y Van Ness (1968) como la extensión de la caminata aleatoria tradicional a la caminata aleatoria sesgada. Dicho proceso se caracteriza por ser un proceso estocástico gaussiano, de media cero y no estacionario, en el que las principales propiedades estadísticas dependen del tiempo<sup>20</sup>. La versión de dicho proceso, luego de un suavizamiento que remueve las altas frecuencias del fBm, se denomina ruido fractal gaussiano.

Procesos como el fBm se pueden definir a través de sus dos primeros momentos estadísticos, sin embargo este se puede generalizar como un modelo multifractal al generar el movimiento fraccional Levy. Este modelo representa procesos en los que la autosemejanza puede tener diferentes orígenes: puede aparecer a partir de la alta variabilidad en situaciones donde los incrementos son independientes y de colas pesadas, o puede aparecer a partir de solo fuerte dependencia, incluso en la ausencia de alta variabilidad (Cont, 2002). Dichos modelos se alejan de la

<sup>18</sup> El periodograma muestra la relación entre las distintas frecuencias de las funciones seno y coseno que componen una serie de tiempo y su aporte a la serie completa.

<sup>19</sup> En muchas aplicaciones el periodograma puede describir bien las frecuencias dominantes, pero puede no describir muy bien el resto. De igual forma, este es demasiado ruidoso por lo que otros estimadores de la magnitud de frecuencia generan mejores resultados.

<sup>20</sup> La estructura de las autocovarianzas es  $\gamma(\tau) = \frac{\sigma^2}{2}(|t|^{2H} + |t - \tau|^{2H} - |t|^{2H})$  y la de las autocorrelaciones  $\rho(\tau) = 2^{2H-1} - 1$

caminata aleatoria tradicional, por lo que tienden a ser considerados ajenos a la teoría tradicional y se pueden considerar como puramente empíricos.

Jensen (1999) demostró que en general toda serie fraccionalmente integrada, definida por  $(1 - B)^d y(t) = \varepsilon(t)$  (donde  $B$  representa el operador de rezago), con  $0,5 < d < 0,5$  y  $\varepsilon(t) \sim \text{i.i.d. } N(0, \sigma^2)$ , luego del análisis multi-resolución basado en *wavelets* genera detalles que se distribuyen  $N(0, \sigma^2 2^{-2jd})$ , donde  $j$  es el parámetro de escalamiento de los *wavelets*. Al tomar la transformación logarítmica, en base 2, de la varianza de los detalles a escala  $j$ , se obtiene la siguiente relación, donde el parámetro de integración fraccional  $d$  puede ser estimado mediante una regresión por MCO:

$$\log_2 \gamma(j) = \log_2 \sigma^2 - 2dj \quad (6)$$


Donde  $\gamma(j)$  es la varianza de los detalles a escala  $j$ ;  $d$  es el parámetro de integración fraccional;  $j$  es el parámetro de escalamiento de los *wavelets*. Según Abry *et al.*, (2009) para el caso particular de procesos autosemejantes como el fBm, en base a  $d$  se puede obtener el exponente de Hurst  $H$  como:

$$H = (0,5 + d) \quad (7)$$

En términos prácticos la ecuación (6) describe la relación que existe entre la varianza correspondiente a cada escala o frecuencia (que se traduce en la varianza para diferentes períodos de muestreo), y dicha escala. Si se cumpliera la regla de la raíz del tiempo dicha relación describiría la forma funcional de la raíz cuadrada, pues a medida que se incrementa el período de muestreo la varianza se incrementaría en forma proporcional a dicha raíz. De esta forma, el supuesto de que es una serie fractal simplemente nos ayuda para que al sólo observar una parte de esta relación se pueda concluir sobre toda la serie, pues ésta se mantiene.

A fin de corroborar las ventajas de la metodología *wavelets* para el análisis de la dependencia de largo plazo, que ya han sido demostradas por trabajos como los de Racine (2011) o los de Bardet *et al.*, (2000), se realizó una simulación de 1000 procesos fBm con parámetro  $H = 0,5$  de longitud 10000, mediante el algoritmo propuesto por Abry *et al.*, (2009), y se estimó el valor de  $H$  para cada uno mediante la ecuación (6) y (7). El histograma que resume los resultados se presenta en el Gráfico 7.

### Gráfico 7. Simulación Monte Carlo para la estimación del parámetro $H$ en series simuladas



Fuente: cálculo del autor

Como se puede observar la distribución de los parámetros encontrados tiende a comportarse como normal<sup>21</sup>, y la media de la estimación se encuentra sesgada en relación con la poblacional. Dicho sesgo es analizado por Jensen (1999), quién demuestra que éste es siempre negativo (por tal los valores estimados se encuentran siempre subestimados) y que disminuye a medida que el parámetro poblacional aumenta. El mismo autor justifica el estimador en razón a que tiene una varianza mucho menor a las del resto de estimadores, que hace que el error cuadrático medio caiga en relación con los mismos. En el presente ejercicio, la desviación estándar de los estimadores es de 0,02.

<sup>21</sup> De hecho al realizar la prueba JarqueBera se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza de 95%.



## 6. Estimación del parámetro $H$ para el caso colombiano.

El exponente de Hurst ( $H$ ), muestra el grado de persistencia o antipersistencia que tienen las series que presentan dependencia de largo plazo. En el presente apartado éste se calcula con base en la metodología descrita anteriormente, para luego ser usado más adelante para reescalar el riesgo de mercado. Dicho parámetro se ajusta por el sesgo que existe en la metodología propuesta.

En el presente análisis se utilizaron datos diarios de algunas de las series financieras más importantes del mercado colombiano. Éstas corresponden al Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC), la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y el índice representativo del mercado de deuda pública interna (IDXTES)<sup>22</sup>. Se tomaron series de periodicidad diaria debido a la facilidad de obtener series largas con este plazo.

La longitud de las series se eligió con base en los experimentos numéricos realizados por Arango *et al.*, (2001), que demuestran que los estimadores de  $H$  son confiables cuando el número de datos es mayor a 1024. Por lo anterior, en la estimación se usaron datos que van desde enero del año 2000 hasta abril del 2012, a excepción de la serie del IGBC, que se tomó desde junio de 2001 dado que en esta fecha se creó el índice.

Los resultados de la aplicación de la metodología anterior a las series mencionadas se resumen en el Cuadro 2 (ver Anexo 1)<sup>23</sup>. Cabe resaltar que los parámetros encontrados no se deben interpretar directamente como una probabilidad, dado que al ser mayores a 0,5 únicamente indican que los retornos tienen un carácter persistente.

**Cuadro 2. Parámetro  $H$  de algunas series financieras colombianas**

Variable	H estimado
IDXTES	0,6843
TRM	0,6370
IGBC	0,6151

Fuente: cálculo del autor

Con el fin de corregir el sesgo del  $H$  anteriormente descrito (que incluye el sesgo por uso de series finitas y el sesgo por el uso de la metodología *wavelets*) y con el

<sup>22</sup> El IDXTES es un índice de retorno total desarrollado por Reveiz y León (2010) para el análisis del mercado de deuda pública colombiano.

<sup>23</sup> La estimación del parámetro anterior se realizó usando el *wavelet* Haar, debido a que Gencay *et al.*, (2002) demuestra que éste funciona bien para series de carácter financiero.

fin de validar la significancia de los resultados, se usa el ajuste propuesto por León y Vivas (2010) y el estadístico  $t$  definido por los mismos autores.

El ajuste se implementó con base en una simulación Monte Carlo<sup>24</sup> que utilizó un algoritmo que “barajó” cada una de las series (100 veces), sin que las características de la serie original (v.g. media, desviación estándar, sesgo, curtosis) fuesen alteradas a fin de eliminar la memoria del proceso, con el propósito de encontrar el sesgo, definido como la diferencia del valor promedio de los parámetros encontrados  $H_f$  y 0,5. Luego de eso se encontró el parámetro ajustado definido como:  $H_{adj} = H - (H_f - 0,5)$ ; es decir, como el valor del parámetro inicial de la muestra menos su sesgo (Cuadro 3).

**Cuadro 2.  $H$  ajustado**

Variable	H ajustado	$t_i$
IDXTES	0,5942	2,8373
TRM	0,5668	1,6617
IGBC	0,5491	1,2064

Fuente: cálculo del autor

De otra parte, la validación de la significancia de los resultados se hace mediante el estadístico  $t$ . Esta prueba es útil para nuestro caso debido a que no se conoce la función de distribución de  $H$  y debido a que como demuestra Conti *et al.*, (2008) los intervalos hallados con esta metodología tienen un buen desempeño asintóticamente hablando<sup>25</sup>. El estadístico  $t$  se calcula con base en el  $H_{adj}$  estimado, y con base en  $\hat{\mu}(H_i)$  y  $\hat{\sigma}(H_i)$  que son el valor esperado y la desviación estándar del  $H_{adj}$  según el algoritmo anteriormente expuesto. Dado que al 95% de confianza se rechaza la hipótesis nula cuando  $t_i$  excede  $\pm 1,96\%$ , se rechaza la hipótesis nula de independencia únicamente para el caso del IDXTES, es decir estadísticamente se comprueba que  $H \neq 0,5$  solo para esta serie<sup>26</sup>.

$$t_i = \frac{H_{adj} - \hat{\mu}(H_i)}{\hat{\sigma}(H_i)} \quad (8)$$

<sup>24</sup>Se uso 10,000 simulaciones.

<sup>25</sup>Conti *et al.*, (2008), compara dos estimadores empíricos con base en simulaciones Monte Carlo. En vez de la función de distribución de los parámetros que no es conocida, en el primer caso usa los valores estimados de media y desviación estándar de una serie de simulaciones tipo *bootstrap* y en el segundo caso los valores obtenidos por medio de una simulación como la propuesta en este trabajo.

<sup>26</sup>Con un 90% de confianza la hipótesis nula se rechazaría para el caso del IDXTES y la TRM.

## 7. Validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al cálculo del riesgo de mercado.

Como se mencionó en un comienzo, la regla de la raíz del tiempo tiene muchas aplicaciones, entre las que se encuentra la relacionada con el cálculo del VaR. Tsay (2002) demuestra que para cualquier metodología usada y bajo los supuestos de independencia tradicionales, se tiene que el VaR para  $k$  períodos es igual al VaR para un período multiplicado por la raíz de  $k$ . Dicho en términos matemáticos:  $VaR(k) = \sqrt{k}VaR$ . Como demuestran Kidnateder y Wagner (2012), dicha regla se puede generalizar para el caso en el que los retornos no se consideran totalmente independientes, quedando de la siguiente manera:

$$VaR(k) = k^{H_{adj}}VaR \quad (9)$$

Dónde  $H$  es el exponente de Hurst ajustado.

Con el fin de validar si la regla de la raíz del tiempo aplica para el caso colombiano, se realizó la estimación de un VaR para varios períodos con la información disponible en cada momento del tiempo, y se proyectó para un horizonte de 10 días usando dicha raíz y los parámetros encontrados buscando realizar un *backtesting* con los resultados obtenidos. Para modelar la volatilidad se eligió únicamente el modelo GARCH (1,1) debido a que obtener una derivación universalmente válida no es viable, ya que los resultados son ampliamente dependientes del modelo usado. Es importante resaltar que los modelos de este tipo han demostrado ampliamente su capacidad de predicción y por eso su amplia difusión en el mercado.

El procedimiento que se siguió para realizar el *backtesting* fue el siguiente:

- 1.) Con base en la información de los dos primeros años de cada serie, se estimó un modelo GARCH (1,1) y se calculó la volatilidad condicional del último período. Dicha volatilidad se usó para calcular el VaR a un día.
- 2.) Luego se tomó la información de los dos años más diez días y se realizó nuevamente la estimación de un GARCH (1,1), calculándose a su vez la volatilidad condicional del último período y el VaR a un día. Se continuó sumando diez días a la muestra y se continuó calculando el VaR a un día.
- 3.) Se multiplicó el VaR a un día por la raíz de 10, para encontrar el VaR a 10 días con la raíz del tiempo. A continuación se multiplicó el VaR a un día por  $10^{H_{adj}}$ , para hallar el VaR a 10 días con el parámetro encontrado.
- 4.) Se procedió a hallar el retorno a diez días para cada una de las fechas en las que se encontró el VaR.
- 5.) Se contrastaron los resultados mediante un *backtesting* con la información de las tres series encontradas.

Para realizar el *backtesting* se usó en primer lugar la prueba de fallos de Kupiec ( $LR_{UC}$ ), que estima si el número de violaciones del VaR para un modelo de riesgo en particular, es significativamente diferente del  $\alpha$  correspondiente al nivel de confianza utilizado (hipótesis nula). Esta se distribuye como una  $\chi^2$  con un grado de libertad, y se usó un nivel de significancia del 10%. En segundo lugar, se realizó una prueba conjunta propuesta por Christoffersen (2003), que además de validar si el número de violaciones es significativamente distinto del esperado, valida si éstas son independientes entre sí o no. Esta prueba conocida como  $LR_{CC}$ , resulta de la suma de la prueba anterior con una prueba de independencia, y se contrasta de igual forma con una  $\chi^2$  con dos grados de libertad. Dicha prueba es importante en este contexto debido a que nos dice si las distintas estimaciones pueden de alguna forma mejorar el desempeño del modelo en cuanto a independencia de los fallos se refiere.

Los resultados de la estimación muestran que en el caso del IDXTES y del IGBC, tanto la regla de la raíz del tiempo como la proyección mediante el parámetro encontrado fallan al capturar el riesgo a diez días con base en el de un día pues no pasan las pruebas de *backtesting* (en la prueba de Kupiec se rechaza la hipótesis nula cuando el estadístico encontrado es mayor a 2,7, mientras que en la de Christoffersen se rechaza cuando es mayor a 4,6). En el caso particular del IDXTES, el VaR a 10 días sobrestima el riesgo real pues ni con la raíz del tiempo, ni con el parámetro encontrado, se presentan violaciones. De otra parte, para el caso de la TRM dicha proyección se ve mejorada con el parámetro encontrado, pues no se rechaza la hipótesis nula de que el VaR está bien especificado, mientras que con la raíz del tiempo sí (Cuadro 3 y Anexo 2).

**Cuadro 3. Resultados pruebas de *Backtesting***

VaR a un día				
Serie	Kupiec*		Cond. Cover.**	
	Raíz del tiempo	H <sub>adj</sub>	Raíz del tiempo	H <sub>adj</sub>
IDXTES	-	-	-	-
TRM	6,097225401	0,030538565	6,10111891	1,419128445
IGBC	8,13265256	11,14257172	8,217561054	11,18013096

\* La prueba de Kupiec se contrasta con una chi cuadrado con un grado de libertad: 2,7

\*\* La prueba de Christoffersen se contrasta con una chi cuadrado con dos grados de libertad: 4,6

Fuente: cálculo del autor

Los anteriores resultados podrían responder a que el parámetro de escalamiento no es constante en el tiempo, por lo que se necesitaría otro tipo de modelo para explicar dichas series (e.g. un modelo multifractal). De igual forma, el tipo de

modelo elegido puede explicar los resultados del ejercicio ya que el hecho de que sea ampliamente usado no implica que sea el de mejor especificación. Esto es muy importante, ya que la predicción del riesgo de mercado recae totalmente en la correcta modelación de la volatilidad. De hecho, trabajos como el de Kidnateder y Wagner (2012) validan el uso de la regla de la raíz del tiempo con un GARCH asimétrico que es un modelo mucho más sofisticado.

## **8. Conclusiones**

El presente trabajo mostró una metodología diferente para la estimación de la dependencia de largo plazo, que demostró que la serie del mercado de renta fija IDXTES posee dependencia de largo plazo que se puede caracterizar como persistente (caminata aleatoria sesgada). En las otras dos series analizadas no existe evidencia estadística que rechace la hipótesis nula de independencia. Esto es importante, pues las implicaciones con respecto a los diferentes modelos económicos y financieros son de gran magnitud; en particular con respecto al resultado que sustenta el uso de la regla de la raíz del tiempo. Cabe anotar que dicha metodología no había sido usada antes para el caso colombiano, por lo que este trabajo contribuye de forma importante a la escasa literatura existente sobre el tema.

Dando alcance a la regulación prudencial internacional, específicamente al CBSB (Comité de Basilea en Supervisión Bancaria) en cuanto a su determinación de exigir sustento técnico adecuado para realizar el escalamiento del riesgo de mercado mediante la regla de la raíz del tiempo, este artículo también demuestra que el uso de cualquier método de escalamiento (ya sea la regla de la raíz del tiempo o el parámetro encontrado) no es coherente con el comportamiento de las series financieras diferentes a la TRM al usar un modelo GARCH (1,1).

Las investigaciones futuras deberán seguir explorando la estructura de dependencia de largo plazo de las series colombianas, para analizar si un parámetro constante es capaz de capturar la complejidad de éstas. En este sentido, hace falta ver si dicho parámetro es cambiante en el tiempo o si se explica por estructuras mucho más complejas (modelos multi fractales, por ejemplo) que no se explican únicamente por sus primeros momentos estadísticos.

## 9. Bibliografía

Abry, P.;Goncalves, P. y Levy V. J. (2009).*Scaling, Fractals and Wavelets*. 1a Ed. Edit. John Wiley&Sons. USA.

Arango M.; Restrepo D.P.y Mesa, O. (2001).“Conjuntos Fractales en el Tiempo y en el Espacio”.*Dyna*. No 68.

Baillie, R. (1996). “Long Memory Processes and Fractional Integration in Econometrics”.*Journal of Econometrics*. Vol. 73, 127-154.

Ball, R. (1995). "The Theory of Stock Market Efficiency: Accomplishments and Limitations". *Journal of Applied Corporate Finance*.Vol. 8 No. 1.Bank of America.

Batten, J.A. y Ellis, C.A. (2005). "Parameter Estimation Bias and Volatility Scaling in Black-Scholes Option Prices". *International Review of Financial Analysis*.Vol 14. No 2.

Bardet, J. M.; Lang, G.; Moulines, E. y Soulier, P. (2000). "Wavelet Estimator of Long Range Dependent Processes".*StatisticalInferenceforStochasticProcesses*. No 85-89.

BIS(2009). “Revisions to the Basel II Market Risk Framework”, *Basel Committee on Banking Supervision*. Bank for International Settlements.

Boutahar, M. y Khalfaoui, R. (2011). "Estimation of the Long Memory Parameter in non Stationary Models: A Simulation Study".*Groupment de Recherche en Economie*. No. 2011-24 .

Christoffersen, F. (2003).*Financial Risk Management*.Academic Press.

Cont, R. (2002). “Long Range Dependance in Financial Markets”. *Fractals in Engineering*.Springer.

Conti, P.; De Giovanni, L.; Stilian, S.; y Taqquu, M. (2008). "Confidence Intervals for the Long Memory Parameter Based on Wavelets and Resampling". *StatisticaSinica*. No 18.

Craig E., y Sundmacher, M. (2010). “ TheEconomic Implications of volatility Scaling by the Square Root of Time rule”. *Stock Market Volatility*. No 7.

Crowley, P. (2005). "An Intuitive Guide to *Wavelets*".*Discussion papers*.Bank of Finland Research.

Fernandez, V. (2005). "The International CAPM and a Wavelet Base Decomposition of Value at Risk". *Studies of Nonlinear Dynamics & Econometrics*, 9(4), article 4.

Gencay, R.; Selcuk, F. y Brandon, W. (2002). *An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics*. Academic Press.

Graps, A. (1995). "An Introduction to Wavelets". IEEE Proceedings Computational Science and Engineering. No 2.

Green, W. H. (1999). *Análisis Económico*. 3a Ed. Edit. Prentice Hall. Madrid (España).

Gregoriou, N. G. (2009). *Stock Market Volatility*. 1ª ed. Edit CRC Press. Nueva York (USA).

Holton, G. A. (1992). "Time: the Second Dimension of Risk". *Financial Analyst Journal*. No 48. Vol 6.

Hurst, H.E. (1951). "Long Term Storage Capacity of Reservoirs". *Transactions of the American Society of Civil Engineers*. No 116.

Jensen, M. J. (1999). "Using Wavelets to Obtain a Consistent Ordinary Least Squares Estimator of the LongMemory Parameter". *MPRA Paper*. No 39152.

Kaiser, G. (1994). *A Friendly Guide to Wavelets*. 1a Ed. Edit Birkhauser (Berlin).

Kidnateder, H. y Wagner, N. (2012). "Market Risk Predictions Under Long Memory: WhernVaR is Higher than Expected". *Social Science Research Network*. Working Paper Series.

Lahura, E. y Vega, M. (2011). "Evaluation of Wavelet Based Core Inflation Measures: Evidence from Perú". *Documento de Trabajo*. No 320. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Leiton, K. (2011). "Validez del Supuesto de Neutralidad del Horizonte de Tiempo en el CAPM y la Metodología del Rango Reescalado: Aplicación a Colombia". *Borradores de Economía*. No. 672. Banco de la República.

León, C.; Leiton, K. y Alejandro R. (2012) "Investment horizon dependent CAPM: Adjusting beta for long-term dependence," *Borradores de Economía*. No 730. Banco de la República.

León, C. y Vivas, F. (2010). "Dependencia de Largo Plazo y la Regla de la Raíz del Tiempo para Escalar la Volatilidad en el Mercado Colombiano". *Borradores de Economía*. No 603. Banco de la República.

Lo, A. (1991). "Long-Term Memory in Stock Market Prices". *Econometrica*. Vol 59. No. 5.

Mallat, S.G. (1989). "A Theory for Multiresolution Signal Decomposition: the Wavelet Representation". *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. Vol 11.

Mandelbrot, B. y Van Ness, J.W. (1968) "Fractional Brownian Motions, Fractional Noises and Applications". *SIAM review*. Vol 10. No 4.

Misiti, M.; Misiti, Y.; Oppenheim, G. y Poggi, J.M. (2011). "Wavelets: A New Tool for Signal Analysis". MathWorks, Inc.

Peters, E. (1991). *Chaos and Order in the Capital Markets*. 2ª Ed. Edit. John Wiley & Sons. USA.

Peña, D. (2010). *Regresión y Diseño de Experimentos*. 2ª Ed. Edit. Alianza Editorial. Madrid (España).

Pérez, J. y Mendoza, J. (2010). "Efecto Día en el Mercado Accionario Colombiano: Una Aproximación No Paramétrica". *Borradores de economía*. No. 585. Banco de la República.

Racine, R. (2011). "Estimating the Hurst exponent". Tesis de pregrado. *Swiss Federal Institute of Technology*, Zurich (Suiza).

Reveiz, A. y León, C. (2010). "Índice Representativo del Mercado de Deuda Pública Interna: IDXTES". *Pensiones y Portafolio: La construcción de una Política Pública* (Eds. Laserna, J.M. y Gómez, M.C.). Banco de la República y Universidad Externado de Colombia.

Scheleicher, C. (2002). *An Introduction to Wavelets for Economists*. Working Paper 2002-03. Bank of Canada.


Taqqu, S.; Teverovsky, V. y Willinger, W. (1999). "A Critical Look at Lo's modified R/S statistic". *Journal of Statistical Planning and Inference*. No 80.

Tsay, R.S. (2002) *Analysis of Financial Time Series*. 1a Ed. Edit. John Wiley & Sons. USA.



Uribe, J. M. y Ulloa, I. M. (2011). "Revisando la hipótesis de los mercados eficientes: nuevos datos, nuevas crisis y nuevas estimaciones". *Cuadernos de Economía*, 30(55), 127-154.

## ANEXO 1. Estimación del parámetro de dependencia de largo plazo (detalles vs escala)



## ANEXO 2. Gráficas *Backtesting*

